



**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
PERSALINAN OPERASI SEKSIO SESAREA DI RUMAH SAKIT  
ISLAM YAKSSI GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2010**

**SKRIPSI**

**Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata I untuk mencapai gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat**

**Oleh :**

**Isti Mulyawati  
NIM 6450406044**

**PERPUSTAKAAN  
UNNES**

**JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2011**

## ABSTRAK

Isti Mulyawati. 2010. **Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Persalinan Operasi Seksio sesarea di Rumah Sakit Islam YAKSSI Gemolong Kabupaten Sragen Tahun 2010.** Skripsi. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing : I. dr. H. Mahalul Azam, M. Kes, M.Kes, II. Dina Nur Anggraini N, S.KM

**VI + 103 Halaman + 23 Tabel + 3 Gambar + 15 Lampiran**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah berdasarkan data yang didapatkan dari rumah sakit Islam YAKSSI Gemolong Kabupaten Sragen menyebutkan bahwa dari 792 persalinan di tahun 2009 terdapat 530 kasus persalinan *Seksio sesarea* (66,91%). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan persalinan operasi *Seksio sesarea* pada persalinan ibu di Rumah Sakit Islam YAKSSI Gemolong Kabupaten Sragen. Hipotesis yang diajukan ialah adanya hubungan antara usia ibu, paritas, tinggi badan, jumlah pemeriksaan kehamilan, riwayat obstetri ibu, kejadian ketuban pecah dini, riwayat penyakit hipertensi ibu, riwayat penyakit asma ibu dan kejadian anemia dengan tindakan persalinan *Seksio sesarea*.

Penelitian ini menggunakan metode survey analitik dengan pendekatan *cross sectional*, menggunakan data primer dari wawancara terpimpin dengan kuesioner serta data sekunder dari rekam medis. Penelitian ini dilaksanakan di RSI YAKSSI Gemolong Kabupaten Sragen pada September-Oktober 2010. Populasi penelitian ini ialah seluruh ibu yang melahirkan di RSI YAKSSI sebanyak 792 responden. Sedangkan sampel pada penelitian ini berjumlah 60 responden yang diambil menggunakan teknik *consecutive sampling*. Analisis bivariat menggunakan uji statistik *chi square* dan *fisher* dengan derajat kemaknaan ( $\alpha$ ) = 0,05.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan persalinan *Seksio sesarea* yaitu diantaranya; usia ibu ( $p$  0,022), paritas (0,001) dan kejadian anemia (0,001). Sedangkan faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan persalinan *Seksio sesarea* yaitu diantaranya tinggi badan ibu ( $p$  1,000), jumlah pemeriksaan kehamilan ( $p$  0,526), riwayat obstetri ibu ( $p$  0,186), kejadian ketuban pecah dini ( $p$  1,000), riwayat penyakit hipertensi ibu ( $p$  1,000) dan riwayat penyakit asma ibu ( $p$  0,673).

Dengan demikian maka disarankan bagi ibu yang memiliki risiko usia  $\leq$  20 tahun dan  $\geq$  35 tahun, paritas 1 dan  $\geq$  4 anak, serta mengalami anemia saat hamil supaya mempersiapkan diri untuk perencanaan operasi *Seksio sesarea*.

**Kata Kunci** : Persalinan, Operasi *Seksio sesarea*

**Literatur** : 39 (1994-2010)

## ABSTRACT

Isti Mulyawati. 2010. **The Factors Related to Pasturition *Seksio sesarea* at Islamic Hospital YAKSSI Gemolong in the Region Sragen in Year 2010.** Final Project. Public Health Department, Faculty of Sports Science, State University of Semarang, Advisor: I. dr. Mahalul Azam, M.Kes, II. Dina Nur Anggraini N, S.KM

**VI + 103 Pages + 23 Tables +3 pictures + 15 Appendices.**

The background of this research was done based on the data that were found at Islamic Hospital YAKSSI Gemolong in the Region Sragen from 792 pasturition in the year 2009 found that 530 *Seksio sesarea* cases (66.91%). The purpose of this research is to know the factors related to *Seksio sesarea* on the mothers' at Islamic Hospital YAKSSI Gemolong. Hypothesis that are achieved there are relation between mother age, parity, bodies taal, pregnant checkup number, mothers' obstetric background, early rupture of the membrane, mothers' hypertension background, mothers' asthma background and the cases anemic of *Seksio sesarea*.

This research using method analytic survey design with *cross sectional* approach, this research use primary data from interview by using questionnaire and the secondary data from medical recording. This research was done at Islamic Hospital YAKSSI Gemolong from September-October in the year 2010. The population of the research is the mothers' who born at Islamic Hospital YAKSSI Gemolong is 792 respondent. In addition, the minimum sampling number that was found 60 respondents. The data was found from this research were analyzed with statistic test *chi square* and *fisher* with a significance ( $\alpha$ ) = 0.05.

The result was found that the factors related to *Seksio sesarea* are mothers' age ( $p$  0.022), parity (0.001) and anemic cases (0.001). Moreover, the factors that is not related to *Seksio sesarea* are mothers' bodies taal ( $p$  1.000), pregnant checkup number ( $p$  0.526), mothers' obstetric background ( $p$  0.186), early rupture of the membrane ( $p$  1.000), mothers' hypertension background ( $p$  1.000) and mothers' asthma background ( $p$  0.673).

In line with the results, it is suggested for mothers who have risk from age  $\leq$  20 years old and  $\geq$  35 years old, the parity 1 and  $\geq$  4, also anemic cases when pregnant in order to prepare themselves for planning *Seksio sesarea*.

**Keyword** : Parturition, *Seksio sesarea*

**Literature** : 39 (1994-2010)